

**Utilisation de pigments latents pour la coloration haute  
tenue, composition contenant lesdits pigments et procédés les  
mettant en oeuvre**

5

L'invention a pour objet l'utilisation des pigments latents pour la coloration des fibres kératiniques, de préférence des fibres kératiniques humaines, et en particulier des cheveux, des procédés de teinture des fibres kératiniques humaines mettant en œuvre ces composés et des compositions particulières contenant ces composés.

Il est connu de teindre les fibres kératiniques humaines et en particulier les cheveux avec des compositions tinctoriales contenant des précurseurs de colorant d'oxydation, appelés généralement bases d'oxydation. Ces bases d'oxydation sont des composés incolores ou faiblement colorés qui, associés à des produits oxydants, donnent naissance par un processus de condensation oxydative à des composés colorés.

On sait également que l'on peut faire varier les nuances obtenues avec ces bases d'oxydation en les associant à des coupleurs ou modificateurs de coloration. La variété des molécules mises en jeu au niveau des bases d'oxydation et des coupleurs permet l'obtention d'une riche palette de couleurs.

Ce procédé de coloration d'oxydation consiste à appliquer sur les fibres kératiniques, des bases d'oxydation ou un mélange de bases d'oxydation et de coupleurs avec un agent oxydant, par exemple de l'eau oxygénée, à laisser poser, puis à rincer les fibres. Les colorations qui en résultent sont permanentes, puissantes, et résistantes aux agents

extérieurs, notamment à la lumière, aux intempéries, aux lavages, à la transpiration et aux frottements.

Si ces colorations permettent d'obtenir des reflets intenses et tenaces, l'utilisation d'un agent oxydant tel que l'eau oxygénée, souvent en présence d'un agent alcalin, entraîne une dégradation de la fibre kératinique.

Il existe donc un réel besoin de rechercher des colorants chromatiques qui permettent de teindre les fibres kératiniques humaines aussi puissamment que les colorants d'oxydation, qui soient aussi stables qu'eux à la lumière, soient également résistants aux intempéries, aux lavages et à la transpiration. Il existe aussi un réel besoin de rechercher des colorants qui permettent d'obtenir des montées de couleur comparables à celles obtenues avec les précurseurs de colorants d'oxydation. De plus, la demanderesse a cherché à obtenir des colorants présentant une bonne innocuité et ne dégradant pas la fibre kératinique.

Les inventeurs ont découvert que l'utilisation de pigments latents permettait de colorer intensément et très durablement la fibre kératinique sans pour autant la dégrader. Ces performances étonnantes sont obtenues à l'aide de pigments latents qui sont des molécules solubles dans les formulations de coloration et qui conduisent à des molécules très peu solubles voire insolubles dans l'eau lorsqu'elles sont dans les fibres kératiniques.

Les pigments latents sont des substances connues. Ils ont été décrits dans la demande de brevet WO 98/32802 notamment dans le domaine des peintures, des encres ou des plastiques.

Un pigment latent est un composé insoluble, ou très peu soluble dans l'eau (comme par exemple un pigment), qui a été transformé de façon à le rendre soluble dans une formulation aqueuse. Ainsi la formulation aqueuse de coloration contenant le pigment latent

est appliquée sur les fibres kératiniques. Après diffusion de ce composé soluble dans les fibres, on fait subir une réaction de "cassure" conduisant à la formation d'une molécule, le pigment final, substantiellement insoluble. Ces réactions de "cassure" sont des méthodes connues. Ce sont des réactions thermiques, chimiques ou photochimiques sur le pigment latent, qui est soluble. Ces réactions provoquent la rupture de la liaison entre le radical chromophore et le ou les groupes solubilisants. Cette réaction de rupture de liaison peut être considérée comme une réaction de régénération du composé d'origine peu soluble et peut être réalisée à l'intérieur de la fibre kératinique.

La présente invention a pour objet l'utilisation pour la coloration de fibres kératiniques, en particulier de fibres kératiniques humaines, plus particulièrement les cheveux, de pigments latents. L'invention concerne également une composition cosmétique comprenant au moins un pigment latent. L'invention a pour autre objet des procédés de coloration des fibres kératiniques utilisant les pigments latents ainsi que des dispositifs de teinture ou « kits » à plusieurs compartiments.

D'autres caractéristiques, aspects, objets et avantages de l'invention figurant dans la description ci-dessous permettront de mieux cerner l'invention.

Conformément à l'invention, on utilise pour la coloration de fibres kératiniques, en particulier de fibres kératiniques humaines, plus particulièrement les cheveux, des pigments latents, solubles dans un milieu approprié pour la teinture, susceptible d'être transformés dans les fibres en pigments insolubles dans l'eau par voie chimique, thermique ou photochimique.

Le pigment latent utilisé selon la présente invention est de préférence représenté par la formule (I)



5

dans laquelle x représente un nombre entier allant de 1 à 8,


A représente le radical chromophore de colorants comprenant un hétéroatome choisi parmi N, O et S, et

10

- lorsque  $x=1$ , B représente un groupe de formule (II),
- lorsque  $x$  est supérieur à 1, B désigne un atome d'hydrogène ou un groupe de formule (II),

B désignant au moins une fois un groupe de formule (II),

Le groupe de formule (II) correspond à



15

(II)

dans laquelle

Z représente un groupement hydrosolubilisant cationique  $Z^+$  ou un résidu de polyéthylèneglycol,

20

Y représente un hétéroatome choisi dans le groupe formé par N, O, et S, Y étant de préférence O,

F et F' représentent, indépendamment l'un de l'autre, une chaîne alkylène en  $C_1$ - $C_{14}$  linéaire ou ramifiée, pouvant contenir des hétéroatomes et pouvant être substituée par un ou plusieurs groupements hydroxy, amino, halogène,

25

n, m, m' désignent indépendamment les uns des autres, 0 ou 1,

B étant lié à un hétéroatome choisi dans le groupe N, O, et S du chromophore A.


$Z^+$  est de préférence un groupe aliphatique, un groupe aromatique, un groupe carbocyclique saturé ou non, un groupe hétérocyclique et porte au moins un atome d'azote quaternisé.

De préférence, le chromophore A est le radical de colorants de type pérylène, quinacridone, dioxazine, isoindoline, indigo, bisisoindoline, phtalocyanine, pyrrolo-pyrrole, quinophtalone, azo, anthraquinone, indanthrone, isoindolinone, naphtoquinone, benzoquinone, azométhine.


On entend par "halogène", un élément choisi parmi le fluor, le chlore, le brome et l'iode.

Plus particulièrement, le radical chromophore A est choisi parmi :

-les dérivés du pérylène de formules (III) ou (IV)



(III)




(IV)

dans lesquelles D représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1-C_6$ , ou un groupe phényle, benzyle, phénéthyle substitués ou non par un groupe alkyle en  $C_1-C_6$ , ou un groupe de formule B,

E représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1-C_6$ , un groupe alcoxy en  $C_1-C_6$  ou un groupe phényle,


-les quinacridones de formule (V)




(V)

5 dans lesquelles  $R_1$  et  $R_2$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe alcoxy en  $C_1$ - $C_6$  ou un groupe phényle,

-les dioxazines de formules (VI) ou (VII)



(VI)




(VII)

10 dans lesquelles  $R_3$  représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène ou un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1$ - $C_6$ ,


15

$R_4$  et  $R_5$  représentent chacun un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_4$ ,


-les isoindolines de formules (VIII), (IX) ou (X)



(VIII)



(IX)




(X)


dans lesquelles  $R_6$  est représenté par la formule (XI),

5  $R_7$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1-C_6$ , un groupe benzyle ou un groupe de formule (XII),

$R_8$  représente un atome d'hydrogène, le groupe de formule (XI) ou le groupe B,



(XI)




(XII)

10  $R_9$ ,  $R_{10}$ ,  $R_{11}$  et  $R_{12}$ , indépendamment les uns des autres, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1-C_6$ , un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$  ou un groupe trifluorométhyle,

15


-les dérivés d'indigo de formule (XIII)




(XIII)

dans laquelle  $R_{13}$  représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$  ou un groupe nitrile,

-les dérivés de bisindolinones de formules (XIV) ou (XV)




(XIV)




(XV)

dans lesquelles  $R_{14}$  et  $R_{15}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_4$  linéaire ou ramifié,



(XVI)




(XVII)



dans lesquelles  $R_{16}$  représente un atome d'hydrogène ou un atome d'halogène,

-les dérivés de phthalocyanine de formule (XVIII)




(XVIII)

10 dans laquelle M représente  $H_2$ , un métal divalent choisi parmi le cuivre, le magnésium, le fer, le zinc, l'aluminium, le manganèse, le calcium, le baryum ou un groupe métallique divalent tel que  $MnO$  ou  $TiO$ ,

$T_1$  représente le groupe  $-CHR_{18}-$ ,  $-CO-$ ,  $-SO_2-$ ,

15  $R_{17}$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe  $-N(B)R_{18}$ ,  $-N(B)_2$ ,  $-NHCOR_{19}$ ,  $-COR_{19}$ , ou le groupe de formule



$R_{18}$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié,

20  $R_{19}$  représente un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié,


$R_{20}$  représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$ ,

$z$  représente 0 ou 1,


$y$  représente un nombre entier de 1 à 8,

5

-les dérivés de pyrrolo-pyrroles de formules (XIX) ou (XX)




(XIX)



(XX)

10

dans lesquels G et L, indépendamment l'un de l'autre, peuvent avoir comme signification :




15

$R_{21}$  et  $R_{22}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1-C_6$ , un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$ , un groupe alkylthio en  $C_1-C_{18}$ , un groupe alkylamino en  $C_1-C_{18}$ , un groupe cyano, nitro, phényle, trifluorométhyle, cycloalkyle en  $C_5-C_6$ , un groupe  $-C=N-$ (alkyle  $C_1-C_{24}$  de préférence en  $C_1-C_6$ ),

20

un groupe de formule



un groupe imidazolyle, pyrazolyle, triazolyle, pipérazinyle, pyrrolyle, oxazolyle, benzoxazolyle, benzothiazolyle, benzimidazolyle, morpholinyle, pipéridinyle ou pyrrolidinyle,

5  $T_2$  représente  $-CH_2-$ ,  $-CH(CH_3)-$ ,  $-C(CH_3)_2-$ ,  $-CH=N-$ ,  $-N=N-$ ,  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-SO-$ ,  $-SO_2-$  ou  $-NHR_{27}$ ,


$R_{23}$  et  $R_{24}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$  ou  $-CN$ ,

10  $R_{25}$  et  $R_{26}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié,


$R_{27}$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié,

15

-les dérivés de quinophthalones de formules (XXI) ou (XXII)



(XXI)



(XXII)


20

dans lesquelles  $R_{28}$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe  $OB$ ,


$R_{29}$ ,  $R_{30}$ ,  $R_{31}$  et  $R_{32}$ , indépendamment les uns des autres, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe  $\text{COOC}_1\text{-C}_6\text{alkyle}$  linéaire ou ramifié, ou un groupe  $\text{CONHC}_1\text{-C}_6\text{alkyle}$  linéaire ou ramifié,

5

-les composés azoïques de formules de (XXIII) à (XXVIII)




(XXIII)




(XXIV)


10




(XXV)



(XXVI)



(XXVII)



(XXVIII)

5


dans lesquelles  $R_{33}$ ,  $R_{34}$ ,  $R_{35}$ ,  $R_{36}$ ,  $R_{37}$ ,  $R_{38}$  et  $R_{40}$  indépendamment les uns des autres, représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe nitro, acétyle ou un groupe  $SO_2NHC_1$ - $C_6$ alkyle,

10


$R_{39}$  représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ ,

-les dérivés d'antraquinones de formule (XXIX) ou (XXX)

15



(XXIX)




(XXX)

5 dans lesquelles  $R_{41}$  et  $R_{42}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_{12}$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , ou un groupe aryle en  $C_6$ - $C_{12}$  qui est non substitué ou substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène, un ou plusieurs groupes alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaires ou ramifiés, nitro, acétyle ou groupe  $SO_2NHC_1$ - $C_6$ alkyle ou  $SO_2NH_2$ ,

10  $R_{43}$  et  $R_{44}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe nitro, cyano,  $CONH_2$ ,  $SO_2NHC_1$ - $C_6$  alkyle,  $SO_2NH_2$ ,  $SO_3H$ ,  $SO_3Na$  ou un groupe aryle en  $C_6$ - $C_{12}$  qui est non substitué ou substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène, un ou plusieurs groupes alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaires ou ramifiés, nitro, acétyle ou  $SO_2NHC_1$ - $C_6$ alkyle ou par  $SO_2NH_2$ ,

15  $R_{45}$  et  $R_{46}$  représentent indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe nitro, cyano, hydroxyle ou amino,

20 -les dérivés d'azométhine de formule (XXXI)



(XXXI)

5 R<sub>47</sub>, R<sub>48</sub>, R<sub>49</sub> et R<sub>50</sub>, indépendamment les uns des autres, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, un groupe nitro, cyano, CONH<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>NHC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alkyle, SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub>H, SO<sub>3</sub>Na ou un groupe aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub> qui est non substitué ou substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène, un ou plusieurs groupes alkyle  
 10 en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> linéaires ou ramifiés, nitro, acétyle ou SO<sub>2</sub>NHC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>alkyle ou par SO<sub>2</sub>NH<sub>2</sub>.

Les compositions cosmétiques conformes à l'invention renferment au moins un pigment latent et au moins un composé choisi  
 15 parmi les agents acidifiants, les agents tensioactifs, les monoalcools ou les polyols liquides à 25°C.

Les agents acidifiants des compositions de l'invention peuvent être minéraux ou organiques. Dans ce dernier cas, les fonctions apportant l'acidité peuvent être des groupements sulfoniques ou carboxyliques. On  
 20 peut citer comme agents acidifiants utilisables selon l'invention, l'acide chlorhydrique, l'acide citrique, l'acide lactique, l'acide tartrique.

La concentration en agents acidifiants peut varier de 0,0001% à 20%, de préférence de 0,01% à 10% du poids total des compositions.

Les monoalcools ou les polyols liquides à 25°C des compositions selon l'invention sont saturés ou non. Ils sont de préférence choisis  
 25 parmi l'éthanol, l'isopropanol, le propylèneglycol, le glycérol, l'héxylèneglycol, l'isoprèneglycol, le dipropylèneglycol, le

néopentylglycol, le 3-méthyl-1,3,5-pentanetriol, le 1,2,4-butanediol, le 1,5-pentanediol, le 2-méthyl-1,3-propanediol, le 3-méthyl-1,5-pentanediol, les polyéthylèneglycols, l'alcool benzylique.

5 Leur concentration peut être comprise entre 0,05% et 50% et de préférence entre 0,1% et 20% du poids total de la composition.

Les tensioactifs peuvent être de nature anionique, non ionique, cationique ou amphotère. Les tensioactifs convenant à la mise en oeuvre de la présente invention sont notamment les suivants :

10 (i) Tensioactif(s) anionique(s) :

A titre d'exemple de tensio-actifs anioniques utilisables, seuls ou mélanges, dans le cadre de la présente invention, on peut citer notamment (liste non limitative) les sels (en particulier sels alcalins, notamment de sodium, sels d'ammonium, sels d'amines, sels  
15 d'aminoalcools ou sels de magnésium) des composés suivants : les alkylsulfates, les alkyléthersulfates, alkylamidoéthersulfates, alkylarylpolyéthersulfates, monoglycérides sulfates ; les alkylsulfonates, alkylphosphates, alkylamidesulfonates, alkylarylsulfonates,  $\alpha$ -oléfine-sulfonates, paraffine-sulfonates ; les alkyl(C<sub>6</sub>-C<sub>24</sub>) sulfosuccinates, les  
20 alkyl(C<sub>6</sub>-C<sub>24</sub>) éthersulfosuccinates, les alkyl(C<sub>6</sub>-C<sub>24</sub>) amidesulfosuccinates ; les alkyl(C<sub>6</sub>-C<sub>24</sub>) sulfoacétates ; les acyl(C<sub>6</sub>-C<sub>24</sub>) sarcosinates et les acyl(C<sub>6</sub>-C<sub>24</sub>) glutamates. On peut également utiliser les esters d'alkyl(C<sub>6</sub>-C<sub>24</sub>)polyglycosides carboxyliques tels que les alkylglucoside citrates, les alkylpolyglycoside tartrate et les  
25 alkylpolyglycoside sulfosuccinates., les alkylsulfosuccinamates ; les acyliséthionates et les N-acyltaurates, le radical alkyle ou acyle de tous ces différents composés comportant de préférence de 12 à 20 atomes de carbone, et le radical aryl désignant de préférence un groupement phényle ou benzyle. Parmi les tensioactifs anioniques encore utilisables,



on peut également citer les sels d'acides gras tels que les sels des acides oléique, ricinoléique, palmitique, stéarique, les acides d'huile de coprah ou d'huile de coprah hydrogénée ; les acyl-lactylates dont le radical acyle comporte 8 à 20 atomes de carbone. On peut également utiliser les  
 5 acides d'alkyl D galactoside uroniques et leurs sels, les acides alkyl ( $C_6-C_{24}$ ) éther carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkyl( $C_6-C_{24}$ )aryl éther carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkyl( $C_6-C_{24}$ ) amido éther carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, en particulier ceux comportant de 2 à 50 groupements oxyde d'alkylène en particulier  
 10 d'éthylène, et leurs mélanges.

(ii) Tensioactif(s) non ionique(s) :


Les agents tensioactifs non-ioniques sont, eux aussi, des composés bien connus en soi (voir notamment à cet égard "Handbook of  
 15 Surfactants" par M.R. PORTER, éditions Blackie & Son (Glasgow and London), 1991, pp 116-178) et leur nature ne revêt pas, dans le cadre de la présente invention, de caractère critique. Ainsi, ils peuvent être notamment choisis parmi (liste non limitative) les alcools, les alpha-diols, les alkylphénols polyéthoxylés, polypropoxylés, ayant une chaîne  
 20 grasse comportant par exemple 8 à 18 atomes de carbone, le nombre de groupements oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène pouvant aller notamment de 2 à 50. On peut également citer les copolymères d'oxyde d'éthylène et de propylène, les condensats d'oxyde d'éthylène et de propylène sur des alcools gras ; les amides gras polyéthoxylés ayant de  
 25 préférence de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant en moyenne 1 à 5 groupements glycérol et en particulier 1,5 à 4 ; les esters d'acides gras du sorbitan oxyéthylénés ayant de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène ; les esters d'acides gras du sucrose, les esters d'acides gras du polyéthylèneglycol, les

alkylpolyglycosides, les dérivés de N-alkyl glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl (C<sub>10</sub> - C<sub>14</sub>) amines ou les oxydes de N-acylaminopropylmorpholine. On notera que les alkylpolyglycosides constituent des tensio-actifs non-ioniques rentrant particulièrement bien dans le cadre de la présente invention.

(iii) Tensioactif(s) amphotère(s) ou zwitterionique(s) :

Les agents tensioactifs amphotères ou zwitterioniques, dont la nature ne revêt pas dans le cadre de la présente invention de caractère critique, peuvent être notamment (liste non limitative) des dérivés d'amines secondaires ou tertiaires aliphatiques, dans lesquels le radical aliphatique est une chaîne linéaire ou ramifiée comportant 8 à 18 atomes de carbone et contenant au moins un groupe anionique hydrosolubilisant (par exemple carboxylate, sulfonate, sulfate, phosphate ou phosphonate) ; on peut citer encore les alkyl (C<sub>8</sub>-C<sub>20</sub>) bétaines, les sulfobétaines, les alkyl (C<sub>8</sub>-C<sub>20</sub>) amidoalkyl (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) bétaines ou les alkyl (C<sub>8</sub>-C<sub>20</sub>) amidoalkyl (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) sulfobétaines.

Parmi les dérivés d'amines, on peut citer les produits vendus sous la dénomination MIRANOL, tels que décrits dans les brevets US-2 528 378 et US-2 781 354 et classés dans le dictionnaire CTFA, 3ème édition, 1982, sous les dénominations Amphocarboxyglycinates et Amphocarboxypropionates de structures respectives :



dans laquelle : R<sub>2</sub> désigne un radical alkyle linéaire ou ramifié en C<sub>5</sub>-C<sub>20</sub> provenant d'un acide R<sub>2</sub>-COOH présent par exemple dans l'huile de coprah hydrolysée, un radical heptyle, nonyle ou undécyle, R<sub>3</sub> désigne

un groupement bêta-hydroxyéthyle et R<sub>4</sub> un groupement carboxyméthyle ;  
et

R<sub>2</sub>'-CONHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-N(B)(C)

5 dans laquelle :

B représente -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OX', C représente -(CH<sub>2</sub>)<sub>z</sub> -Y', avec z = 1 ou 2,

X' désigne le groupement -CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-COOH ou un atome d'hydrogène

Y' désigne -COOH ou le radical -CH<sub>2</sub> - CHOH - SO<sub>3</sub>H

10 R<sub>2</sub>' désigne un radical alkyle linéaire ou ramifié, saturé ou non, en C<sub>5</sub>-C<sub>20</sub> d'un acide R'<sub>2</sub> -COOH présent par exemple dans l'huile de coprah ou dans l'huile de lin hydrolysée, un radical alkyle, notamment en C<sub>7</sub>, C<sub>9</sub>, C<sub>11</sub> ou C<sub>13</sub>, un radical alkyle en C<sub>17</sub> et sa forme iso, un radical C<sub>17</sub> insaturé.

15 Ces composés sont classés dans le dictionnaire CTFA, 5ème édition, 1993, sous les dénominations Disodium Cocoamphodiacetate, Disodium Lauroamphodiacetate, Disodium Caprylamphodiacetate, Disodium Capryloamphodiacetate, Disodium Cocoamphodipropionate, Disodium Lauroamphodipropionate, Disodium Caprylamphodipropionate, Disodium Capryloamphodipropionate, Lauroamphodipropionic acid, 20 Disodium Capryloamphodipropionate, Lauroamphodipropionic acid, Cocoamphodipropionic acid.

A titre d'exemple on peut citer le cocoamphodiacetate commercialisé sous la dénomination commerciale MIRANOL® C2M concentré par la société RHODIA CHIMIE.

25

(iv) Tensioactifs cationiques :

Parmi les tensioactifs cationiques on peut citer en particulier (liste non limitative) : les sels d'amines grasses primaires, secondaires

ou tertiaires, éventuellement polyoxyalkylénées ; les sels d'ammonium quaternaire tels que les chlorures ou les bromures de tétraalkylammonium, d'alkylamidoalkyltrialkylammonium, de trialkylbenzylammonium, de trialkylhydroxyalkyl-ammonium ou d'alkylpyridinium; les dérivés d'imidazoline ; ou les oxydes d'amines à caractère cationique.

Leur concentration peut être comprise entre 0,05% et 50% et de préférence entre 0,2 et 25% du poids total de la composition.

Le milieu approprié pour la teinture appelé aussi support de teinture est de préférence un milieu aqueux contenant au moins un des ingrédients ci-dessus.

De préférence, les compositions selon l'invention ont un pH inférieur à 7.

On peut utiliser dans les compositions des adjuvants cosmétiques classiques utilisés dans les compositions tinctoriales tels que des agents antioxydants, des agents de pénétration, des agents séquestrants, des parfums, des tampons, des agents dispersants, des agents filmogènes, des céramides, des agents conservateurs, des agents opacifiants, des vitamines ou provitamines, des polymères non ioniques, cationiques, anioniques ou amphotères, des agents épaississants minéraux ou organiques, associatifs ou non.

Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires de manière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la composition de teinture conforme à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

Un autre objet de l'invention concerne un procédé de coloration de fibres kératiniques en particulier de fibres kératiniques humaines et plus particulièrement les cheveux mettant en œuvre les pigments latents.

5 Dans un premier temps, on applique sur les fibres kératiniques une composition contenant dans un milieu approprié pour la teinture au moins un pigment latent utilisé selon l'invention.

On laisse agir la composition colorante pendant un temps de pose variant de 1 à 60 minutes, et de préférence de 10 à 45 minutes.

Les fibres sont alors rincées ou non.

10 On traite ensuite le pigment latent sur lesdites fibres par voie thermique, chimique ou photochimique afin de régénérer le composé d'origine peu soluble. De préférence, ce dernier traitement est réalisé par un saut de pH. La solution utilisée permet d'atteindre un pH supérieur à 7. Une solution d'ammoniaque, d'alcanolamine, d'un  
15 hydroxyde alcalin ou d'un carbonate alcalin peut être utilisée.


Enfin, on effectue des étapes de lavage au shampooing et de séchage.

L'invention concerne également un dispositif à 2  
20 compartiments pour la teinture des fibres. Le premier compartiment de ce dispositif renferme une composition colorante contenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un pigment latent utilisé selon l'invention, le second compartiment renferme une solution d'agent chimique susceptible de rendre insoluble le pigment latent en  
25 composé d'origine peu soluble. Le second compartiment renfermera de préférence une solution permettant d'atteindre un pH supérieur à 7.

L'exemple suivant est destiné à illustrer l'invention sans présenter un caractère limitatif.

Exemple :

5 La demanderesse a réalisé une composition contenant le composé A représenté ci-dessous.



10 La composition contenant le composé A a été formulée comme suit :

Formule de coloration	
Natrosol 250MR (hydroxyéthyl cellulose)	0,72g
NIPA ester 82121 (mélange p-hydroxybenzoates de méthyle, butyle, éthyle, propyle, isobutyle)	0,06g
ORAMIX CG 110 (alkyl (C8/C10 50/50) polyglucoside (2) en solution aqueuse à 60% tamponnée)	5g
Alcool benzylique	4g
Polyéthylèneglycol 400(polyéthylène glycol (8 OE))	6g
Composé A	0,3g
Acide citrique	QSP
	pH 4
eau	QSP

La composition a été appliquée sur des cheveux faiblement décolorés avec un rapport de bain de 10.

5      Après un temps de pose de 30 minutes, on applique sur la mèche une solution diluée de triéthanolamine. Ainsi la réaction de régénération a été réalisée par un saut de pH. La couleur de la mèche passe alors du violet au bleu.

La mèche est ensuite shampooinée et séchée. Elle est bleue et la coloration présente un très bon niveau de ténacité.

## REVENDICATIONS

1. Utilisation pour la coloration de fibres kératiniques, en particulier de fibres kératiniques humaines, plus particulièrement les cheveux, d'au moins un pigment latent, soluble dans un milieu approprié pour la teinture, susceptible d'être transformé dans les fibres en pigment insoluble dans l'eau par voie chimique, thermique ou photochimique.

2. Utilisation selon la revendication 1 dans laquelle le pigment latent utilisé selon la présente invention est représenté par la formule (I)




dans laquelle x représente un nombre entier allant de 1 à 8,

A représente le radical chromophore de colorants comprenant un hétéroatome choisi parmi N, O et S, et

- lorsque  $x=1$ , B représente un groupe de formule (II),
- lorsque x est supérieur à 1, B désigne un atome d'hydrogène ou un groupe de formule (II),

B désignant au moins une fois un groupe de formule (II),

Le groupe de formule (II) correspond à



(II)

dans laquelle



Z représente un groupement hydrosolubilisant cationique  $Z^+$  ou un résidu de polyéthylèneglycol,

Y représente un hétéroatome choisi dans le groupe formé par N, O, et S, Y étant de préférence O,

5 F et F' représentent, indépendamment l'un de l'autre, une chaîne alkylène en  $C_1-C_{14}$  linéaire ou ramifiée, pouvant contenir des hétéroatomes et pouvant être substituée par un ou plusieurs groupements hydroxy, amino, halogène,

n, m, m' désignent indépendamment les uns des autres, 0 ou 1,

10 B étant lié à un hétéroatome choisi dans le groupe N, O, et S du chromophore A.

3. Utilisation selon la revendication 2, dans laquelle  $Z^+$  est un groupe aliphatique, un groupe aromatique, un groupe carbocyclique saturé ou non, un groupe hétérocyclique et porte au moins un atome d'azote quaternisé.

15


4. Utilisation selon les revendications 1 et 2, dans laquelle le chromophore A est le radical de colorants de type pérylène, quinacridone, dioxazine, isoindoline, indigo, bisisoindoline, phtalocyanine, pyrrolo-pyrrole, quinophtalone, azo, anthraquinone, indanthrone, isoindolinone, naphtoquinone, benzoquinone, azométhine.

20


5. Utilisation selon les revendications 1 à 3, dans lesquelles le radical chromophore du colorant A est choisi parmi :

25

-les dérivés du pérylène de formules (III) ou (IV)



(III)




(IV)

dans lesquelles D représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>24</sub> linéaire ou ramifié, de préférence en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ou un groupe phényle, benzyle, phénéthyle substitués ou non par un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, ou un groupe de formule B,

E représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>24</sub> linéaire ou ramifié, de préférence en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, un groupe alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ou un groupe phényle,


-les quinacridones de formule (V)




(V)

dans laquelle R<sub>1</sub> et R<sub>2</sub>, indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>24</sub> linéaire ou ramifié, de préférence en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, un groupe alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ou un groupe phényle,

-des dioxazines de formules (VI) ou (VII)



VI




VII


5 dans lesquelles  $R_3$  représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, ou un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1$ - $C_6$ ,

$R_4$  et  $R_5$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_4$ ,


10 -les isoindolines de formules (VIII), (IX) ou (X)



(VIII)



(IX)




(X)


15 dans lesquelles  $R_6$  est représenté par la formule (XI),

$R_7$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe benzyle ou un groupe de formule (XII),

$R_8$  représente un atome d'hydrogène, le groupe de formule (XI) ou le groupe B,




(XI)



(XII)

$R_9, R_{10}, R_{11}, R_{12}$ , indépendamment les uns des autres, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1-C_6$ , un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$  ou un groupe trifluorométhyle,


-les dérivés d'indigo de formule (XIII)




(XIII)

dans laquelle  $R_{13}$  représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$  ou un groupe nitrile.

-les dérivés de bisindolinones de formules (XIV) ou (XV)



(XIV)




(XV)


dans lesquelles  $R_{14}$  et  $R_{15}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_4$  linéaire ou ramifié,

5

-les dérivés d'anthraquinoïdes de formules (XVI) ou (XVII)



(XVI)




(XVII)

10

dans lesquelles  $R_{16}$  représente un atome d'hydrogène ou un atome d'halogène.

-les dérivés de phthalocyanine de formule (XVIII)

15




(XVIII)

dans laquelle M représente  $H_2$ , un métal divalent choisi parmi le cuivre, le magnésium, le fer, le zinc, l'aluminium, le manganèse, le calcium, le baryum ou un groupe métallique divalent tel que MnO ou TiO,

$T_1$  représente le groupe  $-CHR_{18}-$ ,  $-CO-$ ,  $-SO_2-$ ,

$R_{17}$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe  $-N(B)R_{18}$ ,  $-N(B)_2$ ,  $-NHCOR_{19}$ ,  $-COR_{19}$ , ou le groupe de formule




$R_{18}$  représente un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié,

$R_{19}$  représente un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié,


$R_{20}$  représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$ ,  
z représente 0 ou 1,

y représente un nombre entier de 1 à 8,

-les dérivés de pyrrolo-pyrroles de formules (XIX) ou (XX)




(XIX)




(XX)

dans lesquels G et L, indépendamment l'un de l'autre, peuvent avoir comme signification :



- 5  $R_{21}$  et  $R_{22}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_{24}$  linéaire ou ramifié, de préférence en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe alkylthio en  $C_1$ - $C_{18}$ , un groupe alkylamino en  $C_1$ - $C_{18}$ , un groupe cyano, nitro, phényle, trifluorométhyle, cycloalkyle en  $C_5$ - $C_6$ , un groupe -C=N-(alkyle  $C_1$ - $C_{24}$ , de préférence en  $C_1$ - $C_6$ ),  
 10 un groupe de formule




- un groupe imidazolyle, pyrazolyle, triazolyle, pipérazinyle, pyrrolyle, oxazolyle, benzoxazolyle, benzothiazolyle, benzimidazolyle, morpholinyle, pipéridinyle ou pyrrolidinyle,  
 15  $T_2$  représente -CH<sub>2</sub>-, -CH(CH<sub>3</sub>)-, -C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-, -CH=N-, -N=N-, -O-, -S-, -SO-, -SO<sub>2</sub>- ou -NHR<sub>27</sub>,


- $R_{23}$  et  $R_{24}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$  ou -CN,  
 20  $R_{25}$  et  $R_{26}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié,

$R_{27}$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié,

-les dérivés de quinophthalones de formules (XXI) ou (XXII)



(XXI)




(XXII)


dans lesquelles  $R_{28}$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe OB,

$R_{29}$ ,  $R_{30}$ ,  $R_{31}$  et  $R_{32}$ , indépendamment les uns des autres, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe  $COOC_1$ - $C_6$ alkyle linéaire ou ramifié, ou un groupe  $CONHC_1$ - $C_6$ alkyle linéaire ou ramifié,

-les composés azoïques de formules de (XXIII) à (XXVIII)




(XXIII)




(XXIV)







(XXV)



(XXVI)



(XXVII)




(XXVIII)

5  
10 dans lesquelles  $R_{33}$ ,  $R_{34}$ ,  $R_{35}$ ,  $R_{36}$ ,  $R_{37}$ ,  $R_{38}$  et  $R_{40}$  indépendamment les uns des autres, représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe nitro, acétyle ou un groupe  $SO_2NHC_1$ - $C_6$ alkyle,


$R_{39}$  représente un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ ,

-les dérivés d'antraquinones de formule (XXIX) ou (XXX)

5



(XXIX)




(XXX)

dans lesquelles  $R_{41}$  et  $R_{42}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_{12}$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , ou un groupe aryle en  $C_6$ - $C_{12}$  qui est non substitué ou substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène, un ou plusieurs groupes alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaires ou ramifiés, nitro, acétyle ou groupe  $SO_2NHC_1$ - $C_6$  alkyle ou  $SO_2NH_2$ ,

$R_{43}$  et  $R_{44}$ , indépendamment l'un de l'autre, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe nitro, cyano,  $CONH_2$ ,  $SO_2NHC_1$ - $C_6$  alkyle,  $SO_2NH_2$ ,  $SO_3H$ ,  $SO_3Na$  ou un groupe aryle en  $C_6$ - $C_{12}$  qui est non substitué ou substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène, un ou plusieurs groupes alkyle en  $C_1$ - $C_6$  linéaires ou ramifiés, nitro, acétyle ou  $SO_2NHC_1$ - $C_6$  alkyle ou par  $SO_2NH_2$ ,

$R_{45}$  et  $R_{46}$  représentent indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkoxy en  $C_1$ - $C_6$ , un groupe nitro, cyano, hydroxyle ou amino,

-les dérivés d'azométhine de formule (XXXI)



(XXXI)

5

$R_{47}$ ,  $R_{48}$ ,  $R_{49}$  et  $R_{50}$ , indépendamment les uns des autres, représentent un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en  $C_1-C_6$  linéaire ou ramifié, un groupe alkoxy en  $C_1-C_6$ , un groupe nitro, cyano,  $CONH_2$ ,  $SO_2NHC_1-C_6$  alkyle,  $SO_2NH_2$ ,  $SO_3H$ ,  $SO_3Na$  ou un groupe aryle en  $C_6-C_{12}$  qui est non substitué ou substitué par un ou plusieurs atomes d'halogène, un ou plusieurs groupes alkyle en  $C_1-C_6$  linéaires ou ramifiés, nitro, acétyle ou  $SO_2NHC_1-C_6$  alkyle ou par  $SO_2NH_2$ .

15

6. Procédé de coloration de fibres kératiniques en particulier de fibres kératiniques humaines et plus particulièrement les cheveux, ce procédé comprenant les étapes suivantes :

20

- (i) on applique sur les fibres kératiniques une composition contenant dans un milieu approprié pour la teinture, un ou plusieurs pigments latents selon les revendications 1 à 5,
- (ii) on laisse agir la composition colorante pendant un temps de pose variant de 1 à 60 minutes, et de préférence de 10 à 45 minutes,

25

- (iii) après un rinçage éventuel, on traite ensuite le pigment latent sur lesdites fibres par voie thermique, chimique ou photochimique, de préférence par un saut de pH,

(iv) on effectue des étapes de lavage au shampooing et de séchage.

5 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé par le fait que l'on traite le pigment latent sur les fibres kératiniques par une solution d'un composé alcalin.

10 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé par le fait que l'agent alcalin est choisi parmi l'ammoniaque, les alcanolamines, les hydroxydes alcalins, les carbonates alcalins.

15 9. Composition cosmétique contenant au moins un pigment latent et au moins un composé choisi parmi les monoalcools ou les polyols liquides à 25°C, les agents acidifiants, les agents tensioactifs.

10. Composition selon la revendication 9, caractérisée par le fait que le pigment latent est de formule (I) définie à l'une des revendications 1 à 5.

20 11. Composition selon la revendication 9 ou 10, caractérisée par le fait que l'agent acidifiant est de nature minérale ou organique.

25 12. Composition selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisée par le fait que le tensioactif est de nature non ionique, anionique, cationique ou amphotère.

30 13. Composition selon l'une quelconque des revendications 9 à 12, caractérisée par le fait que la concentration en agent acidifiant est comprise entre 0,0001% et 20% et de préférence entre 0,01% et 10% du poids total de la composition.

14. Composition selon l'une quelconque des revendications 9 à 13, caractérisée par le fait que la concentration en agent(s) tensioactif(s) est comprise entre 0,05% et 50% et de préférence entre 0,1% et 20% du poids total de la composition.

15. Composition selon l'une des revendications 9 à 14, caractérisée par le fait que la concentration en monoalcools ou polyols liquides à 25°C est comprise entre 0,05% et 50%, de préférence entre 0,1% et 20% du poids total de la composition.

16. Composition selon l'une quelconque des revendications 9 à 15, caractérisée par le fait que son pH est inférieur à 7.

17. Dispositif à 2 compartiments pour la teinture des fibres kératiniques en particulier de fibres kératiniques humaines et plus particulièrement les cheveux, caractérisé par le fait qu'un premier compartiment renferme une composition colorante contenant, dans un milieu approprié pour la teinture, au moins un pigment latent utilisé selon les revendications 1 à 5, un second compartiment renferme une solution diluée d'un agent chimique susceptible de rendre insoluble le pigment latent en composé d'origine peu soluble.

18. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé par le fait que le second compartiment renferme une solution d'un agent alcalin.


19. Dispositif selon la revendication 17, caractérisé par le fait que le premier compartiment renferme une composition selon l'une quelconque des revendications 9 à 16.

## ABREGE DESCRIPTIF

### Utilisation de pigments latents pour la coloration haute tenue, composition contenant lesdits pigments et procédés les mettant en oeuvre

L'invention concerne l'utilisation pour la coloration de fibres kératiniques d'au moins un pigment latent, soluble dans un milieu approprié pour la teinture, susceptible d'être transformé dans les fibres en pigment insoluble dans l'eau par voie chimique, thermique ou photochimique, de formule  $A(B)_x$

avec A représentant le radical chromophore de colorants,  
et B un atome d'hydrogène ou un groupe de formule (II),



avec Z représentant un groupement hydrosolubilisant cationique  $Z^+$  ou un résidu de polyéthylèneglycol, Y un hétéroatome, F et F' une chaîne alkylène en  $C_1$ - $C_{14}$  linéaire ou ramifiée, pouvant contenir des hétéroatomes et pouvant être substituée par un ou plusieurs groupements hydroxy, amino, halogène.

L'invention concerne également les procédés de coloration des fibres kératiniques utilisant les pigment latents, des compositions particulières les contenant ainsi que des dispositifs de teinture ou « kits » à plusieurs compartiments.